



الضرس الدائم الأول

خدمات مركز طب الأسنان

- طب الأسنان الوقائي.
 - تنظيف وتبييض الأسنان.
 - تجميل الأسنان.
 - تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة.
 - زراعة الأسنان.
 - تقويم الأسنان.
 - علاج العصب - أقنية الجذور.
 - طب أسنان الأطفال - العلاجي والوقائي.
 - علاج أمراض اللثة.
 - جراحة الفم العلاجية.
 - جراحة الفم والوجه والفكين التجميلية.
 - علاج اضطراب المفصل الفكي.
 - خدمات علاجية بالتخدير الجزئي والعام.
 - طوارئ الأسنان على مدار 24 ساعة
- إحجز موعدك مع طبيب الأسنان من خلال الموقع الإلكتروني أو الإتصال على الرقم الداخلي



22232000

بنو القار - شارع بورسعيد - قطعة 9 شعبة 38
www.sih-kw.com 25 40 167



مركز طب الأسنان

داخلي : 1155

- تتمثل عواقب قلع الضرس الدائم الأول فيما يلي :

- تقليل كفاءة المضغ في الجانب الذي قلع منه الضرس وما لذلك من تأثير سيء على صحة الطفل.
- خلل في علاقة الأسنان مع بعضها وفي ترتيب ظهورها .
- انخفاض جانب الوجه في الجهة التي تم فيها قلع الضرس مما يؤثر سلبا على جمال وتناظر الوجه .
- الإنعكاسات النفسية السيئة لدى الطفل والناجمة عن اختلال نظام أسنانه واحتياجه لعلاج تقويم الأسنان .

- الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي قلع الضرس الدائم الأول مبكرا:

- توعية الأطفال وأولياء الأمور بأهمية المحافظة على صحة القم والأسنان .
- متابعة الطفل والإشراف على تعليمه الطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان .



- المواظبة على الزيارة الدورية لطبيب الأسنان حتى مع عدم وجود ألم أو شكوى وذلك حتى يقوم بالإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة للطفل وإعطائه النصائح التوعوية اللازمة .
- المسارعة إلى مراجعة طبيب الأسنان عند الشعور بالألم أو ملاحظة تغيير في لون أو شكل الأسنان حتى يتمكن من علاج التسوس في مراحله الأولى .

- أول الأضراس الدائمة في فم الطفل حيث يظهر في السنة السادسة من عمر الطفل وقد يكون قبل هذا العمر أو بعده .

- يظهر الضرس في الجهة الخلفية من فك الطفل ويلى الأسنان اللبئية من حيث موقعه من الفك السفلي والعلوي.



- يكون الضرس الدائم الأول الأكثر عرضة للتسوس نتيجة للأسباب التالية :

- ظهوره في سن مبكرة من عمر الطفل وبخاصة عند عدم الإهتمام بنظافته وبنظافة الأسنان ككل.
- تعرضه للإهمال وذلك لتصور البعض بأنه أحد الأسنان اللبئية وسوف يتم تبديله لاحقا .
- صعوبة رؤيته داخل فم الطفل حيث يستدعي موقعه من الفك مجهودا أكبر للوصول إليه وتنظيفه سواء من قبل الطفل أو الوالدين .

- يؤدي اهمال الضرس الدائم إلى النتائج التالية:

- نخر الضرس وكلما ازداد اهمال نظافته و علاجه ازداد حجم التسوس الناتج عن ذلك .
- الآلام الشديدة التي قد تسبب صداعا مستمرا ومزعجا .
- تلف الضرس تماما وتعفنه وما ينتج عن ذلك من رائحة وطعم كريهين (في حال اهمال المعالجة) .
- التهاب العظم المحيط بالضرس عند امتداد التلف إليه .
- قلع الضرس التالف كنتيجة حتمية لإهماله وعدم الإلتزام بالمحافظة عليه وعلاجه .