



خدمات مركز طب الأسنان

- طب الأسنان الوقائي.
- تنظيف وتبييض الأسنان.
- تجميل الأسنان.
- تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة.
- زراعة الأسنان.
- تقويم الأسنان.
- علاج العصب - أقنية الجذور.
- طب أسنان الأطفال - العلاجي والوقائي.
- علاج أمراض اللثة.
- جراحة الفم العلاجية.
- جراحة الفم والوجه والفكين التجميلية.
- علاج اضطراب المفصل الفكي.
- خدمات علاجية بالتخدير الجزئي والعام.
- طوارئ الأسنان على مدار 24 ساعة

إحجز موعدك مع طبيب الأسنان من خلال الموقع الإلكتروني أو الإتصال على الرقم الداخلي

القرحات الفموية



22232000

بنو القار - شارع بورسعيد - قطعة 9 شعبة 38
www.sih-kw.com 25 40 167



مركز طب الأسنان

داخلي : 1155

من الانتقاعات وبعض الوذمات في الحفرة الفموية وخاصة على اللسان).

- اضطرابات الاحساس داخل الفم .
- وهن عام .
- ارتفاع لطيف في درجة الحرارة .
- ضخامة في العقدة اللمفية .
- حويصلات مليئة بالسوائل .
- تصيب القرحة الغشاء المخاطي للفم واللسان وسقف الحنك الرخو والحنجرة واللثة .
- تبقى القرحة لمدة تتراوح اسبوع الي اسبوعين ويعدّها تبدأ بالاختفاء تدريجياً وقد تترك ندبة أو أثراً بسيطاً .
- هناك نوع من التقرحات يكون أكثر شدة ويتميز بتكون واحد الى عشرة قرحة كبيرة الحجم وشديدة الألم في الغشاء المخاطي للفم ويستمر لفترة أطول قد تستمر حتى ستة أسابيع وفي الغالب ما تترك أثراً أو ندبة بعد الشفاء .

العلاج:

- لا يوجد علاج محدد للقرحة الفموية حتى الان ولكن هناك بعض الأدوية التي تخفف من الأعراض والألم مثل:
- المضامض الفموية المحتوية على التتراسايكلين .
 - المراهم الكرتيزونية تحتوي مضاد حيوي في نفس الوقت .
 - الفيتامينات .
 - المسكنات .

القرحة الفموية من الأمراض الشائعة والتي تتميز بتكون قرحة واحدة أو أكثر تكون منتشرة في الغشاء المخاطي بالفم وغالباً ما تكون هذه القرحة مؤلمة .

الأسباب:

اسباب حدوث هذه القرحة غير معروفة على وجه التحديد ولكن هناك بعض العوامل المساعدة والتي يعتقد أنها لها دور كبير في حدوث هذا النوع من القرحة وهي:

- بعض أنواع البكتيريا .
- اضطراب في الجهاز المناعي .
- نقص في الحديد والفيتامينات وخاصة فيتامين ب .
- الرضوض بأنواعها المختلفة .
- الاضطرابات النفسية .
- الاضطرابات التحسسية .
- الاضطرابات الهرمونية .

المظاهر السريرية والعلامات التي تظهر في الفم:

الإناث أكثر عرضة للإصابة بالقرحة الفموية من الذكور وغالباً ما تحدث الإصابة بالقرحة خلال الفئة العمرية من 10-30 سنة . هناك 2 % من الناس تعرضوا للإصابة بهذه القرحة مرة أو أكثر خلال حياتهم وتختلف عدد مرات الإصابة بهذه القرحة من شخص لآخر، وهناك بعض المرضى الذي يعانون من إصابة مستمرة بدون انقطاع ولفترة طويلة .

العلامات والأمراض السريرية العامة والموضعية:

تبدأ القرحة بالظهور بالفم على شكل تخريش أو تاكل سطحي في الغشاء المخاطي للفم ويكون هذا التاكل محاطاً بغشاء رمادي اللون وتكون ذات حدود واضحة محددة بالإضافة لكون هذه القرحة محاطة بهالة حمراء اللون، وتكون مؤلمة جداً وخاصة عند الأكل (يتوافق حدوث القرحة بظهور بعض العلامات المختلفة والتي قد لا تتوافق مع كل الحالات وهذه العلامات تشمل ظهور واحدة أو أكثر