



ضرس العقل

بمسئلتنا في السلام الدولي
Al Salam International Hospital
ببازار المتخصصين في خدماتنا المتميزين
Leaders of Excellence in Patient Care

خدمات مركز طب الأسنان

- طب الأسنان الوقائي.
- تنظيف وتبييض الأسنان.
- تجميل الأسنان.
- تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة.
- زراعة الأسنان.
- تقويم الأسنان.
- علاج العصب - أقنية الجذور.
- طب أسنان الأطفال - العلاجي والوقائي.
- علاج أمراض اللثة.
- جراحة الفم العلاجية.
- جراحة الفم والوجه والفكين التجميلية.
- علاج اضطراب المفصل الفكي.
- خدمات علاجية بالتخدير الجزئي والعام.
- طوارئ الأسنان على مدار 24 ساعة

إحجز موعدك مع طبيب الأسنان من خلال
الموقع الإلكتروني أو الإتصال على الرقم الداخلي

22232000

بناية القار - شارع بورسعيد - قطعة 9 شعبة 38
www.sih-kw.com 25 40 167

Your Smile
Our Pleasure
Excellence in Smile & Oral Care

مركز طب الأسنان

داخلي : 1155

أحياناً يحتاج قلع ضرس العقل إلى عمل جراحي وذلك لصعوبة قلعه بالطريقة المعتادة ويتحدد ذلك بحسب ما يلي:
حالة الضرس : حيث أن الضرس المتهدم بشكل كبير يصعب إمساكه بأدوات القلع العادية

نسبة بزوغ الضرس : إذا كان مغطى بالمعظم أو اللثة بشكل كامل أو جزئي .
شكل الجذور : إذا كانت الجذور معوجة فهي عرضة للانكسار أثناء القلع .

عند الاحتياج لقلع ضرس العقل جراحياً أو بدون جراحة فإن هناك إرشادات يجب أن يتبعها المريض لمنع حدوث المضاعفات كاستمرار النزيف أو زيادة التورم الناتج وهي:

- عدم العبث بالجرح لإتاحة الفرصة لتكوين الجلطة الدموية ووقف النزيف
- تجنب المضغ العنيفة خلال الـ 24 ساعة الأولى .
- الاستمرار بالضغط على قطعة الشاش لمدة 3 ساعات .
- مضغ الطعام على الجانب الآخر ومراعاة عدم تناول أي مشروبات ساخنة أو أطعمة صلبة خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد إجراء القلع وتجنب استخدام العيدان المصاصة أثناء شرب السوائل .
- عدم التدخين لمدة 24 ساعة
- عدم بصق أو شفط الجلطة الدموية المتكونة
- استخدام الكمادات الباردة في اليوم الأول على الوجه وذلك لتقليل التورم الناتج بعد الجراحة .
- مراجعة طبيب الأسنان بعد الأسبوع الأول من القلع لإزالة الغرز التي من الممكن أن يكون الطبيب قد استخدمها للمساعدة في التثام الجرح وإيقاف النزيف .
- يجب مراجعة الطبيب في جميع الأحوال بعد الأسبوع الأول من القلع للاطمئنان على سلامة مكان الجرح وخلوه من أي التهاب والتثامه .
- بقى أن نذكر أن إزالة أضراس العقل جراحياً قد يتم تحت المخدر العام إذا ما حدد الطبيب ذلك ودعت الحاجة إليه كحالة المريض الصحية أو النفسية أو الاحتياج لإزالة أضراس العقل الأربعة دفعة واحدة .

ضرس العقل أو الضرس الطاحن الثالث آخر الأسنان الدائمة بزوغاً حيث يبرز هذا الضرس في الفترة ما بين 17 - 25 سنة من العمر وهي فترة النضوج العقلي والعاطفي ولذلك أطلق عليه اسم ضرس العقل . أحياناً لا يجد مساحة كافية للبزوغ فيبقى مدفوناً في عظم الفك أو مغطى باللثة بشكل كامل أو جزئي:

يفضل طبيب الأسنان قلع ضرس العقل إذا تسبب وجوده في إحدى المشكلات التالية :

- إصابته بالتسوس مع صعوبة إجراء علاج العصب،أو التسبب في إصابة الضرس المجاور بالتسوس .
- التهاب اللثة المحيطة بضرس العقل عند بزوغه بشكل جزئي نتيجة لتجمع فضلات الطعام وتزايد نسبة الجراثيم في هذه المنطقة مما يؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم وفي بعض الحالات قد تزداد حدة الالتهابات مما يؤدي إلى تشنج عضلات الوجه وصعوبة فتح الفم .



انظماره وميلانه والذي قد يتسبب في ما يلي:

- الضغط على جذور الضرس المجاور: مما يؤدي إلى تآكلها والتسبب في آلام شديدة .
- دفع وإزاحة الأسنان: مما يؤدي إلى تزامم الأسنان الأمامية .
- تكون كيس حوله: واحتمال تحوله إلى ورم عند إهمال علاجه وعدم إزالته بواسطة المختص .
- إعاقه تثبيت أجهزة التعويض المتحركة .
- هناك أسباب أخرى لقلع ضرس العقل يحددها طبيب الأسنان