



## خدمات مركز طب الأسنان

- طب الأسنان الوقائي.
- تنظيف وتبييض الأسنان.
- تجميل الأسنان.
- تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة.
- زراعة الأسنان.
- تقويم الأسنان.
- علاج العصب - أذية الجذور.
- طب أسنان الأطفال - العلاجي والوقائي.
- علاج أمراض اللثة.
- جراحة الفم العلاجية.
- جراحة الفم والوجه والفكين التجميلية.
- علاج اضطراب المفصل الفكي.

- خدمات علاجية بالتخدير الجزئي والعام.
- طوارئ الأسنان على مدار 24 ساعة

إحجز موعدك مع طبيب الأسنان من خلال الموقع الإلكتروني أو الإتصال على الرقم الداخلي

## علاج العصب للأسنان المؤقتة



مركز التميز في الرعاية الصحية  
Leaders of Excellence in Patient Care

22232000

بناية الفار - شارع بورسعيد - قطعة 9 قسيمة 38  
www.sih-kw.com ☎ 25 40 167



مركز طب الأسنان

داخلي : 1155

## ماهي عملية بتر اللب ؟

الأسنان المؤقتة هي الاسنان التي تظهر في الفم في عمر ستة أشهر ويكتمل بزوغها في عمر السنتين والنصف تقريباً وتستبدل هذه الاسنان فيما بعد بالأسنان الدائمة ، تبدأ عملية التبديل في عمر الست سنوات .. وتنتهي عند بلوغ الطفل الثانية عشرة من عمره ( أي أن بقاء هذه الأسنان في الفم يستمر لفترة محدودة).

يجب المحافظة على هذه الأسنان في مكانها ريثما يحين موعد استبدالها بالأسنان الدائمة وذلك لأنها تؤدي وظائف مهمة تتمثل في :  
**الأكل** : تعمل على تقطيع الطعام بحيث يصل الى المعدة ليناً جاهز للهضم بسهولة مما ينعكس ايجابياً على صحة الجسم.

**المظهر** : تعطي الأسنان مظهراً جميلاً للوجه وينعكس ذلك ايجابياً على الحالة النفسية للشخص .

**النطق** : تلعب الأسنان دوراً هاماً في الكلام واخراج الحروف من أماكنها الصحيحة بمساعدة اللسان والشففتين مما يساعد على النطق الصحيح واعطاء الشخص الثقة بنفسه عندما يتكلم.

بالإضافة الى هذه الوظائف تلعب الأسنان اللبنية دوراً اضافياً من خلال الحفاظ على المسافات اللازمة لبزوغ الأسنان الدائمة .

تختلف الأسنان المؤقتة عن الأسنان الدائمة من حيث بقائها في الفم لفترة محدودة من العمر.

تعتبر طبقة الميناء والعاج المغطية لللب السن رقيقة مقارنة مع الاسنان الدائمة .

تتعرض جنور الاسنان المؤقتة للامتصاص ولتقص طولها نتيجة للأسباب المختلفة .

قد تحتوي جنور هذه الأسنان على عدد غير منتظم من الأقتية الجذرية الدقيقة والتي يصعب ازالة العصب منها أو يستحيل ذلك .

## ماذا يحدث عند اصابة الأسنان المؤقتة بالتهاب العصب؟

عند اصابة الأسنان المؤقتة بالتسوس فان الجراثيم تتصل الى لب السن بسرعة أكبر مما هي عليه في الأسنان الدائمة، وذلك لأن طبقة الميناء والعاج المغطية لللب السن في الأسنان اللبنية أرق مما هي عليه في الأسنان الدائمة .

من الصعب اجراء استئصال كامل للعصب من الأقتية الجذرية. بعد اجراء حشوة الاقتية الجذرية وعند تعرض الجنر للامتصاص فان المادة الحاشية ستصبح خارج السن وستصبح سبب حدوث التهاب النسيج المحيطة بالسن .

عند تعرض لب السن المؤقت للالتهاب فان الطريقة الأنسب للعلاج هي علاج العصب الجزئي (بتر اللب).

وتعتمد هذه الطريقة على ازالة الجزء من العصب الموجود في مستوى تاج السن والذي غالباً مايكون قد تعرض للالتهاب ، والمحافظة على الجزء من العصب الموجود ضمن الأقتية الجذرية في مكانة ، والذي غالباً مايكون سليماً .

## طريقة العمل:



- تخدير السن .



- عزل السن عن الوسط الفموي باستخدام الحاجز المطاطي .



- ازالة الأجزاء المطاطية بالتسوس من السن .



- فتح حجرة اللب في الجزء التاجي من السن .



- ازالة العصب من تاج السن وحتى فتحات الأقتية الجذرية .



- تثبيت العصب الموجود في الأقتية الجذرية باستخدام مادة دوائية (الفورماكرينزول)



- ملء الحجرة اللبية بمادة حاشية ملطفة ( أكسيد الزنك والأجينول)



- الترميم النهائي للسن: ويفضل استخدام التاج المعدني لترميم الأسنان المؤقتة التي أجري لها علاج العصب وهذا سيحمي السن من الانكسار ويساعد السن على القيام بوظائفه المختلفة .

## ملاحظات هامة:

غالباً ما يتم انهاء علاج العصب والترميم النهائي للسن المؤقت في جلسة واحدة .

عند عدم زوال الألم بعد اجراء علاج العصب للسن المؤقت فهذا يعني التهاب العصب بشكل كامل وعندها يجب قلع السن .